

PAKKAUSSELOSTE

Rennie LAKRITSI imeskelytabletti Kalsiumkarbonaatti, magnesiumsubkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieydy 14 päivän jälkeen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Rennie LAKRITSI imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja
3. Miten Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Rennie LAKRITSI imeskelytablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ RENNIE LAKRITSI IMESKELYTABLETTI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Rennie LAKRITSI imeskelytabletti koostuu kahdesta happoja neutraloivasta aineesta, kalsiumkarbonaatista ja magnesiumsubkarbonaatista. Sitä käytetään lievittämään liihakappoisuuteen liittyviä oireita, kuten närästystä ja ruoansulatusvaivoja, kuten mahan turvotuksen tunnetta ja kipua.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RENNIE LAKRITSI IMESKELYTABLETTEJA

Älä käytä Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) kalsiumkarbonaatille, magnesiumsubkarbonaatille tai Rennie LAKRITSI imeskelytabletin jollekin muulle aineelle.
- jos sinulla on
 - vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min)
 - korkea veren kalsiumpitoisuus
 - kalkkimunuainen (nefrokalinoosi)
 - matala veren fosfaattipitoisuus

Ole erityisen varovainen Rennie LAKRITSI imeskelytablettien suhteen

- jos kalsiumin erityksesi virtsaan on heikko.
- jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Voit tällöin käyttää Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta 4).

Yksi Rennie LAKRITSI imeskelytabletti sisältää 475 mg sakkaroosia, mikä on hyvä ottaa huomioon jos sinulla on diabetes.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Tiettyjen valmisteiden imeytyminen saattaa vähentyä. Näitä ovat jotkut antibiootit (kuten tetrasykliinit ja kinolonit), digoksiini (sydänlääke) sekä eri suolat (kuten fosfaatit ja fluoridit). Myös raudan

imeytyminen saattaa vähetä, jos rautavalmistetta otetaan samanaikaisesti Rennie LAKRITSI imeskelytablettien kanssa.

Tietyt nesteenoistolääkkeet (ns. tiatsidit) vähentävät kalsiumin erittymistä virtsaan ja suurentavat näin veren kalsiumpitoisuutta. Siksi lääkärin on syytä seurata säännöllisesti niiden potilaiden seerumiin kalsiumpitoisuutta, jotka käyttävät samanaikaisesti näitä nesteenoistolääkkeitä ja Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja (ks. myös kohta 3, viimeinen kappale).

Ottamalla Rennie LAKRITSI imeskelytabletti eri aikaan kuin muut lääkkeet vältetään muiden lääkeaineiden mahdollinen imeytymisen muuttuminen. Sopiva väli on 1-2 tuntia.

Rennie LAKRITSI imeskelytabletin käyttö ruuan ja juoman kanssa

On suositeltavaa ottaa tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä. Tabletit purraan tai niitä imeskellään. Vettä ei tarvita.

Raskaus ja imetys

Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja voidaan käyttää raskauden aikana kunhan valmistetta käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Pitkäkestoista valmisteen käyttöä on vältettävä. Kalsiumkarbonaattia ja magnesiumsubkarbonaattia voidaan käyttää imetyksen aikana, kunhan annettuja ohjeita noudatetaan.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rennie LAKRITSI imeskelytabletit eivät vaikuta ajamiseen eivätkä koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Rennie LAKRITSI imeskelytablettien sisältämistä aineista

Jos sinulla on jokin harvinainen periytyvä sokerien aineenvaihduntaan liittyvä häiriö, keskustele lääkärin kanssa Rennie LAKRITSI imeskelytablettien käytöstä. Voi olla etteivät ne sovi sinulle.

3. MITEN RENNIE LAKRITSI IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Tavanomainen annos on 1 - 2 tablettiä jotka pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. On suositeltavaa ottaa tabletti/tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä.

Ota närästys- ja kiputilanteissa 1 - 2 tablettiä heti oireiden ilmaannuttua, mutta älä olla enempää kuin 11 tablettiä vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Rennie LAKRITSI imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Pitkään jatkuva suurten annosten käyttö voi heikentää munuaisten toimintaa ja aiheuttaa muutoksia veren suola- ja happotasapainossa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa mm. pahoinvointia, oksentelua tai ummetusta sekä lihaskramppeja. Jos yliannostus on vaikea, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Keskustele lääkärisi kanssa jos käytät nesteenoistolääkettä ja haluaisit aloittaa Rennie LAKRITSI imeskelytablettien käytön.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Rennie LAKRITSI imeskelytabletti, voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yliherkkyyksireaktioita on ilmaantunut hyvin harvoin (ihottuma, nokkosrokko, turvotus kasojen alueella tai äkillinen, voimakas allerginen reaktio eli ns. anafylaksia) . Jos sairastat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa, voi Rennie LAKRITSI imeskelytabletin pitkään jatkuva käyttö suurina annoksina johtaa mahaoireisiin ja lihasheikkouteen. Siksi lääkärin pitää valvoa Rennie LAKRITSI imeskelytablettien käyttöä, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa. Vaikka munuaiset ovat terveet saattaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivaa, ripulia, päänsärkyä ja lihasheikkoutta ilmaantua.

5. RENNIE LAKRITSI IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaukset säilytetään huoneenlämmössä (+15-25 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Rennie LAKRITSI imeskelytabletti sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti (680 mg yhdessä imeskelytablettissa) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskelytablettissa).

Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, aspartaami (10 mg, E951), anismakuaine (sis. mm. luonnollinen makea fenkoliöljy, luonnollinen anisöljy, maltodekstriini, bentsyylialkoholi, anetoli) ja lakritsimakuaine (sis. mm. luonnollinen kiinalainen kaneliöljy, maltodekstriini, bentsyylialkoholi, metyyliisiklopentenoloni, anetoli).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä lakritsinmakuaisia imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tabletin kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy,
Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja:

Bayer Santé Familiale, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puhelin 020 785 21, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 10.01.2011

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Rennie LAKRITSI sugtablett kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Rennie LAKRITSI sugtabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Rennie LAKRITSI sugtabletter är och vad de används för
2. Innan du använder Rennie LAKRITSI sugtabletter
3. Hur du använder Rennie LAKRITSI sugtabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rennie LAKRITSI sugtabletter ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD RENNIE LAKRITSI SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

Rennie LAKRITSI sugtabletter består av två syraneutraliserande ämnen, kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat. Medicinen används för att lindra matsmältningsbesvär, såsom uppsvullen buk och magsmärtor.

2. INNAN DU ANVÄNDER RENNIE LAKRITSI SUGTABLETTER

Använd inte Rennie LAKRITSI sugtabletter

- om du är allergisk (överkänslig) mot kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat eller mot något av de övriga innehållsämnen i Rennie LAKRITSI sugtabletter
- om du har
 - svår njursvikt (kreatininclearance mindre än 30 ml/min)
 - hög kalciumhalt i blodet
 - nefrokalcinos (njurförkalkning)
 - låg fosfathalt i blodet

Var särskilt försiktig med Rennie LAKRITSI sugtabletter

- om din utsöndring av kalcium i urinen är svag.
- om din njurfunktion är nedsatt. Då kan du använda Rennie LAKRITSI sugtabletter endast under läkarkontroll (se avsnitt 4).

En Rennie LAKRITSI sugtablett innehåller 475 mg sackaros, vilket kan vara bra att beakta om du har diabetes.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Upptaget av vissa läkemedel kan minska. Detta kan gälla bl.a. vissa antibiotika (bl.a. tetracykliner och kinoloner), digoxin (hjärtmedicin) och olika salter (t.ex. fosfater och fluorider). Också upptaget av järn kan försvagas, om järnpreparat tas samtidigt med Rennie LAKRITSI sugtabletter.

Vissa urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika) kan reducera utsöndringen av kalcium i urinen, vilket höjer kalciumhalten i blodet. Därför är det befogat att läkare uppföljer regelbundet kalciumhalten för de patienter som använder samtidigt dessa urindrivande läkemedel och Rennie LAKRITSI sugtabletter (se också avsnitt 3, sista stycket).

Ta gärna Rennie LAKRITSI sugtabletter vid en annan tidpunkt än dina andra läkemedel. Därigenom undviks eventuella upptagsstörningar för dina andra mediciner. Lämpligt tidsintervall är 1 - 2 timmar.

Användning av Rennie LAKRITSI sugtablett med mat och dryck

Enligt rekommendationen ska Rennie LAKRITSI sugtabletter tas en timme efter måltid och vid sängdags. Tabletterna tuggas eller sugas. Vatten behövs inte.

Graviditet och amning

Rennie LAKRITSI sugtabletter kan användas under graviditet, under förutsättning att tabletterna används enligt ordination. Långvarigt bruk ska undvikas. Kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat kan användas under amning, under förutsättning att tabletterna används enligt ordination.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rennie LAKRITSI sugtabletter inverkar varken på körförmågan eller på förmågan att använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämne i Rennie LAKRITSI sugtabletter

Om du har någon sällsynt ärftlig störning i sockeromsättningen, ska du diskutera användningen av Rennie LAKRITSI sugtabletter med en läkare. Det är tänkbart att sugtablettarna inte är lämpliga för dig.

3. HUR DU ANVÄNDER RENNIE LAKRITSI SUGTABLETTER

Vanlig dos är 1 - 2 tabletter som tuggas eller som får långsamt smälta i munnen vid behov. Rekommendationen är att ta tablett/tabletterna en timme efter måltid och vid sängdags.

Om du får halsbränna eller smärta, ska du genast vid första symptom ta 1 - 2 tabletter. Ta inte mera än 11 tabletter under ett dygn.

Användning för barn

Rennie LAKRITSI sugtabletter rekommenderas inte för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Rennie LAKRITSI sugtabletter

Användning av höga doser under längre tid kan försvaga njurfunktionen och påverka salt- och syrabalansen i blodet. Detta kan i sin tur ge bl.a. illamående, kräkningar eller förstoppning och muskelsvaghet. Om det är fråga om stor överdosering, ska du ta kontakt med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använder vätskedrivande mediciner (diuretika), ska du tala med din läkare innan, om du vill använda Rennie LAKRITSI sugtabletter.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Rennie LAKRITSI sugtabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Överkänslighetsreaktioner har förekommit mycket sällan (utslag, nässelutslag, svullnad i ansiktsområdet eller plötslig, kraftig allergisk reaktion [s.k. anafylaxi]). Om du har svår njursvikt, kan långvarig användning av Rennie LAKRITSI sugtabletter i höga doser ge magsymptom och muskelsvaghet. Därför måste läkare övervaka användningen av Rennie LAKRITSI sugtabletter om du har njursvikt. Också för personer med friska njurar kan illamående, kräkningar, magbesvär, diarré, huvudvärk och muskelsvaghet förekomma.

5. HUR RENNIE LAKRITSI SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blisterförpackningarna förvaras i rumstemperatur (+15 - 25 °C).

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg i 1 sugtablett) och magnesiumsubkarbonat (80 mg i 1 sugtablett)

De övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatinerad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, aspartam (10 mg, E951), anissmakämne (inneh. bl.a. naturlig söt fänkålsolja, naturlig anisolja, malodextrin, bensylalkohol, anetol) och lakritsmakämne (inneh. bl.a. naturlig kinesisk kanelolja, maltodextrin, bensylalkohol, metylcyklopentenolon, anetol).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gräddvita, kvadratiska, konvexa, lakritsmakande sugtabletter med avrundade hörn, diameter cirka 15 mm, på båda sidorna av tablettens står det "RENNIE".

24 och 96 tabl., PVC/Al-blistertförpackning, pappkartong, bipacksedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Bayer Oy,
Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare:
Bayer Santé Familiale, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard, Frankrike

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bayer Oy, Consumer Care, Kägelstranden 12, 02150 Esbo. Telefon 020 785 21, fax 020 7858214.

Denna bipacksedel godkändes senast 10.01.2011