

PAKKAUSSELOSTE

RENNIE imeskelytabletti **RENNIE SPEARMINT imeskelytabletti** Kalsiumkarbonaatti, magnesiumsubkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieydy 14 päivän jälkeen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Rennie/Rennie Spearmint imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja
3. Miten Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ RENNIE/ RENNIE SPEARMINT IMESKELYTABLETTI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletti koostuu kahdesta happoja neutraloivasta aineesta, kalsiumkarbonaatista ja magnesiumsubkarbonaatista. Sitä käytetään lievittämään liikkahappoisuuteen liittyviä oireita, kuten närästystä ja ruoansulatusvaivoja, kuten mahan turvotuksen tunnetta ja kipua.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RENNIE IMESKELYTABLETTEJA

Älä käytä Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) kalsiumkarbonaatille, magnesiumsubkarbonaatille tai Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletin jollekin muulle aineelle.
- jos sinulla on
 - vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min)
 - korkea veren kalsiumpitoisuus
 - kalkkimunuainen (nefrokalsinoosi)
 - matala veren fosfaattipitoisuus

Ole erityisen varovainen Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytablettien suhteen

- jos kalsiumin erityksesi virtsaan on heikko.
- jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Voit tällöin käyttää Rennie/ Rennie Spearmint valmistetta vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta 4).

Yksi Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletti sisältää 475 mg sakkaroosia, mikä on hyvä ottaa huomioon jos sinulla on diabetes.

Rennie Spearmint sisältää makeutusaineena myös sakkariinatriumia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Tiettyjen valmisteiden imeytyminen saattaa vähentyä. Näitä ovat jotkut antibiootit (kuten tetrasykliinit ja kinolonit), digoksiini (sydänlääke) sekä eri suolat (kuten fosfaatit ja fluoridit). Myös raudan imeytyminen saattaa vähetä, jos rautavalmistetta otetaan samanaikaisesti Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytablettien kanssa.

Tietyt nesteenoistolääkkeet (ns. tiatsidit) vähentävät kalsiumin erittymistä virtsaan ja suurentavat näin veren kalsiumpitoisuutta. Siksi lääkärin on syytä seurata säännöllisesti niiden potilaiden seerumiin kalsiumpitoisuutta, jotka käyttävät samanaikaisesti näitä nesteenoistolääkkeitä ja Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja (ks. myös kohta 3, viimeinen kappale).

Ottamalla Rennie/Rennie Spearmint eri aikaan kuin muut lääkkeet vältetään muiden lääkeaineiden mahdollinen imeytymisen muuttuminen. Sopiva väli on 1-2 tuntia.

Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletin käyttö ruuan ja juoman kanssa

On suositeltavaa ottaa tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä. Tabletit purraan tai niitä imeskellään. Vettä ei tarvita.

Raskaus ja imetys

Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja voidaan käyttää raskauden aikana kunhan valmistetta käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Pitkäkestoista valmisteen käyttöä on vältettävä.

Kalsiumkarbonaattia ja magnesiumsubkarbonaattia voidaan käyttää imetyksen aikana, kunhan annettuja ohjeita noudatetaan.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletit eivät vaikuta ajamiseen eivätkä koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytablettien sisältämistä aineista

Jos sinulla on jokin harvinainen periytyvä sokerien aineenvaihduntaan liittyvä häiriö, keskustele lääkärin kanssa Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytablettien käytöstä. Voi olla etteivät ne sovi sinulle.

3. MITEN RENNIE/RENNIE SPEARMINT IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Tavanomainen annos on 1 - 2 tablettia, jotka pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. On suositeltavaa ottaa tabletti/tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä.

Ota närästys- ja kiputilanteissa 1 - 2 tablettia heti oireiden ilmaannuttua, mutta älä ota enempää kuin 11 tablettia vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Pitkään jatkuva suurten annosten käyttö voi heikentää munuaisten toimintaa ja aiheuttaa muutoksia veren suola- ja happotasapainossa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa mm. pahoinvointia, oksentelua tai ummetusta sekä lihaskramppeja. Jos yliannostus on vaikea, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Keskustele lääkärisi kanssa jos käytät nesteenoistolääkettä ja haluaisit aloittaa Rennie/ Rennie Spearmint valmisteen käytön.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytabletti, voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yliherkkyysoireita on ilmaantunut hyvin harvoin (ihottuma, nokkosrokko, turvotus kasvojen alueella tai äkillinen, voimakas allerginen reaktio eli ns. anafylaksia). Jos sairastat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa, voi Rennie/ Rennie Spearmint valmisteen pitkään jatkuva käyttö suurina annoksina johtaa mahaoireisiin ja lihasheikkouteen. Siksi lääkärin pitää valvoa Rennie/ Rennie Spearmint imeskelytablettien käyttöä, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa. Vaikka munuaiset ovat terveet saattaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivaa, ripulia, päänsärkyä ja lihasheikkoutta ilmaantua.

5. RENNIE/RENNIE SPEARMINT IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Rennie imeskelytabletti: PVC/Al-läpipainopakkaus: Huoneenlämpö (+15-25 °C).

Alumiini/paperipakkaus: Säilytä alle + 30 °C. Alumiini/paperipakkaus on säilytettävä suojassa kosteudelta.

Rennie Spearmint imeskelytabletti: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Rennie imeskelytabletti sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti (680 mg yhdessä imeskelytablettissa) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskelytablettissa).

Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatarkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, piparminttumakuaine (piparminttuöljy, maltodekstriini, akaasiakumi, piidioksidi), sitruunamakuaine (sitruunaöljy, maltodekstriini, vesi).

Mitä Rennie Spearmint imeskelytabletti sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti (680 mg yhdessä imeskelytablettissa) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskelytablettissa).

Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatarkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, spearmint-makuaine (minttuöljy (mentha spicata L) ja mentha piperita L), akaasiakumi, sakkariinatrium (0,80 mg).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rennie imeskelytabletti:

Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulumista pyöristettyjä piparmintumakuisia imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tabletin kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24, 48 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.
36 tabletin alumiini/paperipakkaus, muovikotelo, taustapahvi, pakkausseloste.

Rennie Spearmint imeskelytabletti:

Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä spearmint-makuisia imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tabletin kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy,

PL 73, 02151 Espoo, Suomi

Puhelin 020 785 21, telefaksi 020 7858214

Valmistaja:

Bayer Santé Familiale, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Bayer Oy, Consumer Care

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 2.9.2010

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

RENNIE sugtablett RENNIE SPEARMINT sugtablett kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Rennie / Rennie Spearmint sugtabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter är och vad de används för
2. Innan du använder Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter
3. Hur du använder Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD RENNIE/RENNIE SPEARMINT SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter består av två syraneutraliserande ämnen, kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat. Medicinen används för att lindra matsmältningsbesvär, såsom uppsvullen buk och magsmärta.

2. INNAN DU ANVÄNDER RENNIE/RENNIE SPEARMINT SUGTABLETTER

Använd inte Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter

- om du är allergisk (överkänslig) mot kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat eller mot något av de övriga innehållsämnen i Rennie sugtabletter
- om du har
 - svår njursvikt (kreatininclearance mindre än 30 ml/min)
 - hög kalciumhalt i blodet
 - nefrokalcinos (njurförkalkning)
 - låg fosfathalt i blodet

Var särskilt försiktig med Rennie/Rennie Spearmint sugtabletter

- om din utsöndring av kalcium i urinen är svag
- om din njurfunktion är nedsatt. Då kan du använda Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter endast under läkarkontroll (se avsnitt 4).

En Rennie/ Rennie Spearmint sugtablett innehåller 475 mg sackaros, vilket kan vara bra att beakta om du har diabetes.

Rennie Spearmint innehåller även sötningsmedlet sackarinnatrium.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Upptaget av vissa läkemedel kan minska. Detta kan gälla bl.a. vissa antibiotika (bl.a. tetracykliner och kinoloner), digoxin (hjärtmedicin) och olika salter (t.ex. fosfater och fluorider). Också upptaget av järn kan försvagas, om järnpreparat tas samtidigt med Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter.

Vissa urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika) kan reducera utsöndringen av kalcium i urinen, vilket höjer kalciumhalten i blodet. Därför är det befogat att läkare uppföljer regelbundet kalciumhalten för de patienter som använder samtidigt dessa urindrivande läkemedel och Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter (se också avsnitt 3, sista stycket).

Ta gärna Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter vid en annan tidpunkt än dina andra läkemedel. Därigenom undviks eventuella upptagsstörningar för dina andra mediciner. Lämpligt tidsintervall är 1 - 2 timmar.

Användning av Rennie/ Rennie Spearmint sugtablett med mat och dryck

Enligt rekommendationen ska Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter tas en timme efter måltid och vid sängdags. Tabletterna tuggas eller sugas. Vatten behövs inte.

Graviditet och amning

Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter kan användas under graviditet, under förutsättning att tabletterna används enligt ordination. Långvarigt bruk ska undvikas. Kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat kan användas under amning, under förutsättning att tabletterna används enligt ordination.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter inverkar varken på körförmågan eller på förmågan att använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämne i Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter

Om du har någon sällsynt ärftlig störning i sockeromsättningen, ska du diskutera användningen av Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter med en läkare. Det är tänkbart att sugtablettarna inte är lämpliga för dig.

3. HUR DU ANVÄNDER RENNIE/ RENNIE SPEARMINT SUGTABLETTER

Vanlig dos är 1 - 2 tabletter som tuggas eller som får långsamt smälta i munnen vid behov. Rekommendationen är att ta tablett/tabletterna en timme efter måltid och vid sängdags.

Om du får halsbränna eller smärta, ska du genast vid första symptom ta 1 - 2 tabletter. Ta inte mera än 11 tabletter under ett dygn.

Användning för barn

Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter rekommenderas inte för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter

Användning av höga doser under längre tid kan försvaga njurfunktionen och påverka salt- och syrabalansen i blodet. Detta kan i sin tur ge bl.a. illamående, kräkningar eller förstoppning och muskelsvaghet. Om det är fråga om stor överdosering, ska du ta kontakt med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använder vätskedrivande mediciner (diuretika), ska du tala med din läkare innan, om du vill använda Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Överkänslighetsreaktioner har förekommit mycket sällan (utslag, nässelutslag, svullnad i ansiktsområdet eller plötslig, kraftig allergisk reaktion s.k. anafylaxi). Om du har svår njursvikt, kan långvarig användning av Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter i höga doser ge magsymptom och muskelsvaghet. Därför måste läkare övervaka användningen av Rennie/ Rennie Spearmint sugtabletter om du har njursvikt. Också för personer med friska njurar kan illamående, kräkningar, magbesvär, diarré, huvudvärk och muskelsvaghet förekomma.

5. HUR RENNIE/RENNIE SPEARMINT SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Rennie sugtabletter: PVC/Al-blistersförpackningen: I rumstemperatur (+ 15-25 °C).

Aluminium/pappersförpackningen: Förvaras under + 30 °C. Aluminium/pappersförpackningen bör skyddas mot fukt.

Rennie Spearmint sugtabletter: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Rennie sugtablett:

De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg i 1 sugtablett) och magnesiumsubkarbonat (80 mg i 1 sugtablett)

De övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatinerad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, pepparmyntssmakämne (pepparmyntsolja, maltodextrin, acaciagummi, kiseldioxid), citronsmakämne (citronolja, maltodextrin, vatten).

Rennie Spearmint sugtablett:

De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg i 1 sugtablett) och magnesiumsubkarbonat (80 mg i 1 sugtablett)

De övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatinerad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, spearmintsmakämne (pepparmyntsolja [mentha spicata L ja mentha piperita L], acaciagummi), sackarinnatrium (0,80 mg).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rennie sugtablett: Gräddvita, kvadratiska, konvexa, pepparmyntssmakande sugtabletter med avrundade hörn, diameter cirka 15 mm, på båda sidorna av tablettens står det "RENNIE".

24, 48 eller 96 tabl., PVC/Al-blistersförpackning, pappkartong, bipacksedel.

36 tabletter i aluminium/pappersförpackning, plastfodral, stödapp, bipacksedel.

Rennie Spearmint sugtablett:

Gräddvita, kvadratiska, konvexa, spearmintsmakande sugtabletter med avrundade hörn, diameter cirka 15 mm, på båda sidorna av tablettens står det "RENNIE".

24, 48 eller 96 tabl., PVC/Al-blistersförpackning, pappkartong, bipacksedel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Oy,

PB 73, 02151 Esbo, Finland

Telefon 020 785 21, telefax 020 7858214

Tillverkare:

Bayer Santé Familiale, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard, Frankrike

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Care

Denna bipacksedel godkändes senast 2.9.2010